



IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDART PRIVIND PRIVIND MANAGEMENTUL MEDICAMENTELOR DE RISC ÎNALT

POS: MUM-14



Lista electrolitelor concentrați utilizați în instituția medicală:

- Clorură de potasiu conc./sol.perf.400 mg/10 ml;
- Clorură de calciu sol.inj. 500 mg/5 ml;
- Gluconat de calciu sol. inj.100 mg/ml;
- Sulfat de magneziu sol. inj. 250 mg/ml;
- Hidrocarbonat de sodiu sol. perf. 4%;

Această listă se revizuește anual sau ori de câte ori apar modificări ori este necesar.

Depozitarea si etichetare medicamentelor cu risc înalt în cadrul FARMACIEI spitalului

Electrolitii concentrați se păstrează pe rafturi **separate** de alte medicamente

Marcajul colorat pe raft:

“Roșu” pentru **electrolitii foarte concentrați** (clorura de potasiu 22,5%)

“Albastru” –alți **electroliti electroliti** .

Etichetare Obligatorie a electrolitilor corespunzător cu mențiunea:

"A nu se administra nediluat"

Depozitarea si etichetare medicamentelor cu risc înalt în cadrul SECȚIEI și SĂLII DE PROCEDURI

Electrolitii concentrați se păstrează în dulapuri închise, separate de alte medicamente

Marcajul colorat pe raft:

“Roșu” pentru **electrolitii foarte concentrați** (clorura de potasiu 22,5%)

“Albastru” –alți **electroliti electroliti** .

La momentul preluării electrolitilor din dulap se plasează într-un recipient separat

Se verifică prezența etichetei obligatorie a electrolitilor corespunzător cu mențiunea:

"A nu se administra nediluat"

Modul de gestionare (1)

Distribuția - POS MUM-11

Indicațiile - vor fi prescrise conform indicațiilor din Rezumatul Caracteristicii Produsului (RCP), POS MUM-03

DILUAREA - Electroliții concentrați nu se administrează nediluați, conform instrucțiunilor Rezumatului Caracteristicii Produsului sau Instrucțiunilor Interne

Asistenta medicală pregătește soluția sub supravegherea a unei a doua persoane instruite

Modul de gestionare (2)

- **Administrarea** se face **lent**, sub control strict și în terapiile intensive - **prin pompă de perfuzie**, pentru a controla rata de administrare.
- **Monitorizarea** semnelor vitale și parametrii biochimici pe parcursul perioadei de indicație.

Secțiile din Departamentul Terapie, Chirurgie și Chirurgie Cardiovasculară și toracică

Anexa 2 (pentru administrarea soluției Promedol 2%- 1,0 ml)

Anexa 3 (pentru administrarea soluției Morfină 1%- 1,0 ml)

Secțiile din Departamentul ATI

Anexa 4 (pentru administrarea soluției Morfină , Promedol, Omnopon, Fentanil)